

Gemüsebau-Empfehlungen 2017

Pilzliche Krankheiten

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Pilzliche Schaderreger		
Spargel, Gurke, Möhre, Speisezwiebel, Knollensellerie, Tomate, Patisson, Zucchini, Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Gartenkürbis, Salatarten, Spinat und verwandte Arten, Kopfkohle	Cuprozin progress (S. 87 – 112)	Neues Kupferpräparat mit Kontaktwirkung
Falscher Mehltau		
Zwiebelgemüse, Kohlrabi	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	Kontaktwirkung
Echte Mehltaupilze / Laubkrankheit		
Blattkohle, Blumenkohle, Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Zucchini, Patisson, Gurke, Garten-Kürbis, Frische Kräuter, Gewürzkräuter, Teekräuter, Hülsengemüse, Kopfkohle, Tomate, Wurzel- und Knollengemüse, Kohlrabi, Knoblauch, Perlwiebel, Schalotte, Spargel, Winterheckenzwiebel	Kumar (S. 291 – 306)	Nicht rückstandsrelevantes Kontaktfungizid

Unkrautbeseitigung

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter		
Gemüsekulturen (z. B. Spargel, Zwiebelgemüse)	Roundup PowerFlex (S. 359–378)	nach der Ernte ODER nach dem Wiedereergrün- en bis 2 Tage vor der Saat ODER bis 2 Tage vor dem Pflanzen
Acker-Winde Spargel	Roundup PowerFlex (S. 359–378)	Einsatz in der Zwischen- reihenbehandlung mit Abschirmung ODER Einzelpflanzenbehandlung im Streichverfahren (33%ig)
Fruchtgemüse, Möhre	Roundup PowerFlex (S. 359–378)	Zwischenreihenbehand- lung mit Abschirmung
Gemeines Hirtentäschel, Gemeines Kreuzkraut, Acker-Senf, Vogel-Sternmiere		
Rhabarber	FLEXIDOR (S. 169–186)	dem Pflanzen vor dem Auflaufen der Unkräuter vor dem Austrieb
Gemeines Hirtentäschel, Gemeines Kreuzkraut, Acker-Senf, Vogel-Sternmiere		
Spargel	FLEXIDOR (S. 169–186)	In Junganlagen mit Sämlingspflanzen, ab 1. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet; erste Laubblätter entfaltet, im Pflanzjahr vor dem Auf laufen der Unkräuter nach dem Pflanzen
Schwarzer Nachtschatten		
Spargel	Vorox F (S. 477–492)	In Ertragsanlagen, Unterblattbehandlung mit Abschirmung
Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter		
Salate, Endivien, Chicoree, Wurzelzichorie	Kerb FLO (S. 271–290)	Im Vorauf lauf oder, nach dem Pflanzen mit Einregnen
Ein- und Zweikeimblättrige Unkräuter		
Rhabarber	Kerb FLO (S. 271–290)	Oktober-Dezember im Ruhezustand der Pflanzen

Tierische Schädlinge

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Kohlmottenschildlaus, Mehliges Kohlblattlaus Kleine Kohlflyge		
Kohlarten (Jungpflanzen in Anzuchtgefäßen)	Dantop (S. 113 – 122)	Fraß- und Kontakt- wirkung, ausgeprägte Dauerwirkung
Spinnmilben		
Aubergine, Gemüsepaprika, Gurke, Tomate, Zucchini im Freiland und Gewächshaus	Floramite 240 SC (S. 187 – 196)	Wirksam gegen alle Entwicklungsstadien, Nützlingsschonend
Schnecken		
Salat-Arten Kohlgemüse	Schneckenkorn Spiess-Urania G2 (S. 395 – 402)	Granulatköder, regen- und schimmelfest
	Patrol MetaPads G2 (S. 321 – 328)	Köderkissen mit hoher Lockwirkung, regen- und schimmelfest
Blattläuse, Zikaden		
Frische Kräuter	Dantop (S. 113 – 122)	Fraß- und Kontakt- wirkung, ausgeprägte Dauerwirkung
Zuckermais, Speiserüben, Beten, Kohlrübe, Speisezwie- bel, Hülsengemüse, Teekräuter, Radieschen, Meerrettich, Rettich, Erbse, Möhre, Buschbohne	Hunter (S. 249 – 266)	Insektizid gegen beißende und saugende Insekten