

















Obstbau-Empfehlungen 2017

Empfehlungen für den Kernobstbau bis Ballon-Stadium

BBCH	01/03	07	09	10/54	11/55	56	57	59
nach Fleckinger								
	A	B	C	C ₃	D	E	E ₂	F
	Knospenschwellen	Kospenaufbruch	Grüne Spitzen	Mausohr-Stadium	Entfaltung der ersten Blätter. Blütenknospen noch geschlossen	Blütenknospen spreizen sich ab	Blütenblätter werden sichtbar	Ballon-Stadium
Pilzliche Krankheiten								
Schorf	Cuprozin progress (S. 87 – 112), Funguran progress (S. 219 – 230)							

Empfehlungen für den Kernobstbau ab Blüte

BBCH	60	65	67	69	71	72	74	75-85
nach Fleckinger	 F ₁ -F ₂	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M
	Aufblühen bis Vollblüte	Vollblüte	Abgehende Blüte	Nachblüte	Nachblüte	Haselnußgröße	Walnußgröße	Spätere Stadien
Pilzliche Krankheiten								
Schorf an Apfel						Kumar (S. 291 – 306)		
Obstbaumkrebs (Holzpilze)						Nach der Ernte als Blattfallspritzung: Cuprozin progress (S. 87 – 112) Funguran progress (S.219 – 230)		
Düngung								
							FRUTOGARD M (S. 507 – 510)	
Stippe Lagerfähigkeit								
							Düngal Calcium (S.499 – 502)	
Tierische Schädlinge								
Apfelwickler/Obstmade						Mimic (S. 311 – 320)		
Apfel-/Fruchtschalenwickler			Mimic (S. 311 – 320)					

Obstbau-Empfehlungen 2017

Pilzliche Krankheiten

Problem	Produkt (Seite)	Hinweise
Kern- und Steinobst, Schalenobst, Beerenobst		
Bei diversen Krankheiten	Cuprozin progress (S. 87 – 112)	Bitte Gebrauchsanleitung beachten
Kern- und Steinobst		
Pflaumenrost an Pflaume	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	bei Befallsbeginn
Narrentaschenkrankheit an Zwetschge	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	bei Blüte oder Befallsgefahr
Schorf an Apfel	Kumar (S. 291 – 306)	ab Walnussgröße der Früchte
Beerenobst		
Rot- und Weißflecken an Erdbeeren	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	vor der Blüte oder nach der Ernte
Blattfallkrankheit an an Johannisbeeren und Stachelbeeren	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	vor der Blüte oder nach der Ernte
Säulenrost an Roten und Schwarzen Johannisbeeren	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	vor der Blüte oder nach der Ernte
Grauschimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) an Erdbeeren	Frupica SC (S. 215 – 218)	Beginn bis Ende Blüte

Tierische Schädlinge

Problem	Produkt (Seite)	Hinweise
Erdbeeren		
Schnecken	Patrol MetaPads G2 (S. 321 – 328) Schneckenkorn Spiess-Urania G2 (S. 395 – 402) Floramite 240 SC (S. 187 – 196)	bei beginnendem Befall zwischen die Reihen streuen im Freiland (April bis September) und im Gewächshaus
Freifressende Schmetterlingsraupen	Mimic (S. 311 – 320)	in Beständen zur Pflanzguterzeugung
Beißende und saugende Insekten (ausgen. Erdbeerblütenstecher)	Hunter (S. 249 – 266)	Vermehrungsanlagen
Kernobst		
Apfel-, Fruchtschalenwickler	Mimic (S. 311 – 320)	ab Schlupf der ersten Larven
Steinobst		
Freifressende Schmetterlingsraupen	Mimic (S. 311 – 320)	ab Schlupf der ersten Larven

Unkrautbeseitigung

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter		
Kernobst, Steinobst	Roundup PowerFlex (S. 359 – 378) Roundup REKORD (S. 379 – 394)	Baumstreifenbehandlung ab Frühjahr bis Ende Juni Baumstreifenbehandlung ab Frühjahr bis Ende Juni
Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter		
Johannis- und Himbeerartiges Beerenobst, Kernobst (ausgenommen Apfel) und Steinobst	FLEXIDOR (S. 169 – 186)	Im Frühjahr bis Blühbeginn

Unkrautbeseitigung

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere		
Schalen-, Kern- und Steinobst, Johannis- und Stachelbeere, Himbeerartiges Beerenobst, Schwarzer Holunder, Heidelbeere	Kerb FLO (S. 271 – 290)	Winter (in der Vegetationsruhe)
Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter		
Kernobst, Steinobst, Beerenobst (ausgenommen Erdbeeren)	Vorox F (S. 477 – 492)	Abdrift unbedingt vermeiden

Noch Unkrautbeseitigung

Problem	Produkt (Seite)	Hinweise
Erdbeeren		
Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	FLEXIDOR (S. 169 – 186)	nach der Ernte oder im Pflanzjahr nach dem Pflanzen
einkeimblättrige Unkräuter Vogel-Sternmiere	Kerb FLO (S. 271 – 290)	Winter (in der Vegetationsruhe)

Spezialdünger

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Kernobst	FRUTOGARD M (S. 507 – 510)	Bei Bedarf